

Flugreise während einer Schwangerschaft



ALLES WAS SIE BEI EINER FLUGREISE ALS SCHWANGERE BEACHTEN SOLLTEN

Flugreise während einer Schwangerschaft

Was gilt bei einer Schwangerschaft bzgl. Flugreisen?

In der Schwangerschaft besteht ein erhöhtes Thromboserisiko, sodass eine entsprechende Vorbeugung sinnvoll ist (Tragen von Kompressionsstrümpfen, ggf. zusätzlich Anwendung gerinnungshemmender Mittel). Ab der 28. Schwangerschaftswoche (SSW) ist der Flugesellschaft ein ärztliches Unbedenklichkeitsattest vorzuweisen, das bei Reiseantritt nicht älter als eine Woche sein darf. Bei einer Mehrlingschwangerschaft ohne Komplikationen gilt allgemein eine Flugtauglichkeit bis zur 32. SSW und bei einer Einlingschwangerschaft ohne Komplikationen eine Flugtauglichkeit bis zu 36. SSW.

Achtung: Die Bestimmungen einzelner Fluggesellschaften können hiervon abweichen, eine individuelle Anfrage vor Antritt der Reise ist zu empfehlen. Eine absolute Kontraindikation für das Fliegen besteht u.a. bei bestehenden Blutungen, Blutarmut oder eingeschränkter Plazentafunktion.